

Eigenschap hoofdpijn	Spanningshoofdpijn		Migraine (met of zonder aura)		Cluster hoofdpijn	
Pain locatie ¹	Bilateraal		Uni- of bilateraal		Unilateraal (rond het oog, boven het oog en langs het hoofd/gezicht).	
Pijn kwaliteit	Drukkend/knellend (niet pulserend)		Pulserend (kloppend of dreunend in jonge mensen tussen 12-17 jaar)		Variabel (scherp, bovend, brandend, kloppend of drukkend)	
Pijn intensiteit	Mild tot matig		Matig - hoog		Hoog, erg hoog	
Effect op activiteiten	Niet erger door ADL		Erger door ADL, of veroorzaakt vermijding van ADL		Rusteloosheid, agitatie	
Andere symptomen	Geen		-Gevoeligheid voor licht en/of geluid en/of braken -Aura: met of zonder hoofdpijn, volledig reversibel. Ontwikkelt zich over ten minste 5 minuten, duurt 5-60 minuten. Typische verschijnselen zijn flikkerende lichten, zigzaglijnen of gedeeltelijk verlies van visus (scotomen), sensorische verschijnselen zoals gevoelloosheid en/of paresthesieën en/of spraak problemen		Aan dezelfde kant als de hoofdpijn: -rood of waterig oog -nasale verstopping en/of lopende neus -gezwollen ooglid -zweeten voorhoofd en gezicht -verkleinde pupil en/of hangend ooglid	
Duur hoofdpijn	30 minuten - constant		4-72 uur in volwassenen, 1-72 uur bij jonge mensen tussen 12-17 jaar		15-180 minuten	
Frequentie hoofdpijn	< 15 dagen/maand	≥15 dagen/maand langer dan 3 maanden	< 15 dagen/maand	≥15 dagen/maand langer dan 3 maanden	1 om de dag tot 8/dag ³ , dan remissie ⁴ voor langer dan een maand	1 om de dag tot 8/dag ³ , dan remissie ⁴ voor minder dan een maand binnen een jaar
	Episodische spanningshoofdpijn	Chronische spanningshoofdpijn²	Episodische migraine (met of zonder aura)	Chronische migraine met of zonder aura	Episodische cluster hoofdpijn	Chronische cluster hoofdpijn

¹ Hoofdpijn kan worden gevoeld in het hoofd, gezicht of nek. ² Chronische migraine en chronische spanningshoofdpijn overlappen vaak. Als er symptomen van migraine zijn, stel dan de diagnose chronische migraine. ³ Frequentie van terugkerende hoofdpijn tijdens een aanval van cluster hoofdpijn. ⁴ De pijnvrije periode tussen cluster hoofdpijn aanvallen.

Vertaald en aangepast van de Hoofdpijnrichtlijn van NICE: © National Institute for Health and Clinical Excellence, 2012.